

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ



ВЫСОКОПАТОГЕННЫЙ ГРИПП ПТИЦ – острая инфекционная, особо опасная болезнь, передаваемая человеку от животных, возбудителем которой является вирус типа А.

К гриппу восприимчивы все виды птиц, в т. ч. куры, индейки, утки, фазаны, цесарки, перепела, глухари, аисты, чайки и практически все другие виды синантропных (голуби, воробьи, вороны, чайки, утки, галки и пр.), диких, экзотических и декоративных птиц, а также свиньи, лошади, хорьки, мыши, кошки, собаки, иные позвоночные и человек.

Грипп птиц не вызывает массового заболевания диких птиц и протекает у них бессимптомно, однако среди домашних птиц может вызывать тяжелое заболевание и гибель. Источником заражения являются больные птицы, выделяющие вирус с истечениями из носа и рта, экскрементами, яйцом, а также переболевшие птицы (срок вирусоносительства 2 месяца). Данное заболевание характеризуется потенциально высокой опасностью возбудителя для человека. Основным источником вируса в природе являются водоплавающие птицы, которые переносят вирус в кишечнике и выделяют его в окружающую среду со слюной и пометом. У диких уток вирус гриппа размножается главным образом в клетках, выстилающих желудочный тракт, при этом никаких видимых признаков заболевания у самих птиц вирус не вызывает и в высоких концентрациях выделяется в окружающую среду.

На территории Российской Федерации: за 6 месяцев 2023 года в 28 регионах зарегистрированы 62 очага высокопатогенного гриппа птиц (далее – ВПГ), при этом 51 очаг – за последние 2 месяца, в том числе 46 очагов – в связи с выявлением возбудителя ВПГ среди нетипичного вида полусинантропной птицы (чайка). Во всех случаях в регионах Российской Федерации введены ограничительные мероприятия (карантин) по высокопатогенному гриппу птиц.

Владельцам птицы рекомендуется не допускать:

- ✓ контакта домашней птицы с дикими и синантропными птицами, в том числе отлов дикой водоплавающей птицы содержания в личных подсобных хозяйствах;
- ✓ потрошение охотничьих трофеев дичи на территории дворов и скормливание отходов домашней птице;
- ✓ посторонних лиц в места содержания домашней птицы;
- ✓ употребление в пищу и скормливание животным подозрительной в заболевании птицы.

Владельцам птицы необходимо обеспечить следующее:

- ✓ информировать государственную ветеринарную службу района о наличии птицы в личных подсобных хозяйствах с целью проведения необходимых профилактических мероприятий у имеющегося поголовья.
- ✓ не допускать поение и купание птиц в открытых водоемах, где останавливается дикая птица;
- ✓ содержать птиц в условиях, исключающих контакт с дикими и синантропными птицами (безвыгульное содержание, ограждения из сетки, оборудование навесов, отпугивание и т.п.), особенно в период осенних и весенних перелетов птицы;
- ✓ приобретать молодняк птицы и инкубационное яйцо, а также корма для птиц, из благополучных источников, воздерживаться от приобретения живой птицы на рынках и в местах несанкционированной торговли и от случайных лиц;
- ✓ позаботиться об изолированном хранении кормов в закрытом помещении или закрытых емкостях таким образом, чтобы исключить его контаминацию секретами и экскрементами диких и синантропных птиц;
- ✓ позаботиться об изолированном хранении инвентаря по уходу за домашними птицами и спецодеждой, содержать их в чистоте;
- ✓ проводить своевременную уборку дворовых территорий и загонов от мусора и продуктов жизнедеятельности птиц, складировать помет в гидроизоляционные емкости или траншеи;
- ✓ кормление птиц осуществлять в помещении в целях недопущения россыпи кормов на выгуле и привлечении диких птиц;
- ✓ раздельно содержать разные виды птиц (кур содержать отдельно от водоплавающих птиц);
- ✓ использовать пух и перо для бытовых целей только после тепловой обработки;
- ✓ иметь запас дезинфицирующих средств и проводить дезинфекцию инвентаря и птичников после их полной очистки;
- ✓ обеззараживание помета и подстилки путем сжигания или биотермическим методом (путем выдерживания в закрытых земляных траншеях с гидроизоляционным слоем в течение 6 месяцев);
- ✓ при первых признаках заболевания, аномального поведения птиц (отказ от корма и воды; взъерошенность оперения; опухание головы; изменение цвета гребня, бородок и конечностей; нарушение координации движения; тремор; неестественная поза; помутнение роговицы глаз у водоплавающих птиц и др.) и случаях внезапного массового падежа птицы немедленно обратиться в ближайшие учреждения государственной ветеринарной службы для выявления причин заболевания птицы и недопущения эпизоотии.

В целях личной безопасности граждан необходимо соблюдать правила личной гигиены: уход за птицей осуществлять в спецодежде, потрошение птицы производить в перчатках и т.п.

В период угрозы гриппа птиц:

- 1) для предотвращения заражения птицы гриппом в индивидуальных хозяйствах граждан необходимо строго соблюдать меры профилактики гриппа птиц, описанные выше.
- 2) установить на подворьях пугала, трещотки и другие средства для отпугивания диких птиц.
- 3) во время карантина не рекомендуется покупать живую птицу и пополнять поголовье птицы.
- 4) ухаживать за птицей, проводить уборку помещений и территории необходимо в выделенной для этих целей рабочей одежде (халат, передник, рукавицы, резиновая обувь).
- 5) во время уборки не следует пить, принимать пищу, курить.
- 6) вся рабочая одежда перед стиркой должна подвергаться дезинфекции путем замачивания в 3% растворах хлорамина Б в течение 30 минут или кипячения в 2% растворе соды кальцинированной.

При обнаружении трупов птиц или выявлении больной птицы на улице либо в личных подсобных хозяйствах граждан в целях проведения необходимых мероприятий исследованию их на грипп птиц необходимо незамедлительно сообщить в ветеринарную службу Камышловского района или в органы местного самоуправления.

Контактная информация:

- 1. ГБУСО Камышловская ветстанция, г. Камышлов, ул. Фарфористов, д. 1,
☎: (34375) 2-48-43;**
- 2. Администрация Галкинского сельского поселения: Камышловский район,
с.Квашнинское. ул. Ленина, 49, ☎: (34375) 44-1-37**